

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a preprint version which may differ from the publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/121728>

Please be advised that this information was generated on 2018-02-21 and may be subject to change.

SUR LES TYPES D'HOMOTOPIE MODÉLISÉS PAR LES ∞ -GROUPOÏDES STRICTS

par

Dimitri Ara

À la mémoire de Jean-Louis Loday

Résumé. — L'objet de ce texte est l'étude de la classe des types d'homotopie qui sont modélisés par les ∞ -groupeïdes stricts. Nous démontrons que la catégorie homotopique des ∞ -groupeïdes stricts simplement connexes est équivalente à la catégorie dérivée en degré homologique $d \geq 2$ des groupes abéliens. Nous en déduisons que les types d'homotopie simplement connexes modélisés par les ∞ -groupeïdes stricts sont exactement les produits d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane. Nous étudions également brièvement le cas des 3-catégories avec des inverses faibles. Nous terminons par deux questions autour du problème suggéré par le titre de ce texte.

Abstract (On homotopy types modeled by strict ∞ -groupoids)

The purpose of this text is the study of the class of homotopy types which are modeled by strict ∞ -groupoids. We show that the homotopy category of simply connected strict ∞ -groupoids is equivalent to the derived category in homological degree $d \geq 2$ of abelian groups. We deduce that the simply connected homotopy types modeled by strict ∞ -groupoids are precisely the products of Eilenberg-Mac Lane spaces. We also briefly study 3-categories with weak inverses. We finish by two questions about the problem suggested by the title of this text.

Table des matières

Introduction	2
1. ∞ -groupeïdes stricts	4
2. Équivalences faibles de ∞ -groupeïdes stricts	6
3. La catégorie homotopique	10
4. La catégorie homotopique des ∞ -groupeïdes stricts simplement connexes	11
5. Types d'homotopie et ∞ -groupeïdes stricts	18
6. Types d'homotopie et 3-groupeïdes quasi-stricts	20
7. Deux questions	21
Références	22

Classification mathématique par sujets (2000). — 18B40, 18D05, 18E30, 18E35, 18G35, 18G55, 55P10, 55P15, 55Q05, 55U15, 55U25, 55U35.

Mots clefs. — ∞ -groupeïde strict, type d'homotopie, complexe de chaînes, catégorie homotopique, espace d'Eilenberg-Mac Lane.

Introduction

Dans *Pursuing Stacks* ([12]), Grothendieck propose de généraliser le fait classique suivant : le foncteur groupoïde fondamental $\Pi_1 : \mathcal{Top} \rightarrow \mathcal{Gpd}$, de la catégorie des espaces topologiques vers la catégorie des groupoïdes, induit une équivalence de catégories $\overline{\Pi}_1 : \mathbf{Hot}_1 \rightarrow \mathbf{Ho}(\mathcal{Gpd})$ entre la catégorie des 1-types d'homotopie et la localisation de la catégorie des groupoïdes par les équivalences de groupoïdes. Il conjecture l'existence d'une structure algébrique de ∞ -groupoïdes (faibles) et d'un foncteur ∞ -groupoïde fondamental qui induirait une équivalence de catégories entre la catégorie homotopique \mathbf{Hot} et une localisation de la catégorie des ∞ -groupoïdes (faibles) (voir [2] pour un énoncé précis de cette conjecture).

Grothendieck est conscient du fait que les ∞ -groupoïdes stricts ne permettent pas de réaliser cette équivalence de catégories. En effet, il lui apparaît comme évident le fait que les types d'homotopie simplement connexes modélisés par ceux-ci sont exactement les produits d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane : « At first sight it had seemed to me that the Bangor group had indeed come to work out (quite independently) one basic intuition of the program I had envisioned in those letters to Larry Breen. [...] But finally it appears this is not so, they have been working throughout with a notion of ∞ -groupoid too restrictive for the purposes I had in mind (probably because they insist I guess on strict associativity of compositions, rather than associativity up to a (given) isomorphism (or rather, homotopy) — to the effect that the simply connected homotopy types they obtain are merely products of Eilenberg-Mac Lane spaces. »

Ce résultat apparaît huit ans plus tard dans [9], où il est attribué à Loday. (Le résultat est exprimé en termes de complexes croisés mais ceux-ci sont équivalents aux ∞ -groupoïdes stricts par [8].)

Dans ce texte, qui est essentiellement un remaniement du premier chapitre de la thèse [1] de l'auteur, nous présentons une preuve élémentaire de ce résultat, sans doute plus proche de celle que Grothendieck avait en tête. Voici comment s'articule cette preuve. L'argument de Eckmann-Hilton montre qu'un ∞ -groupoïde strict avec un unique objet et une unique 1-flèche (on dira qu'un tel ∞ -groupoïde est 1-réduit) est canoniquement un ∞ -groupoïde strict en groupes abéliens. Par un théorème de Bourn ([6]), la donnée d'un tel ∞ -groupoïde est équivalente à celle d'un complexe de groupes abéliens en degré homologique $d \geq 2$. On en déduit facilement que la catégorie homotopique des ∞ -groupoïdes stricts 1-réduits est canoniquement équivalente à la catégorie dérivée $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ des groupes abéliens en degré homologique $d \geq 2$. En utilisant un résultat classique sur les catégories dérivées, on obtient que tout ∞ -groupoïde strict 1-réduit est faiblement équivalent à un produit de ∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane. Puisque tout ∞ -groupoïde simplement connexe est faiblement équivalent à un ∞ -groupoïde strict 1-réduit, on obtient facilement que tout foncteur de réalisation topologique raisonnable envoie un ∞ -groupoïde strict simplement connexe sur un produit d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane.

En fait, nous obtenons un résultat plus précis. La catégorie homotopique des ∞ -groupoïdes simplement connexes est canoniquement équivalente à la catégorie dérivée $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$. Ce résultat est une conséquence facile des considérations précédentes et de l'existence de la structure de catégorie de modèles de Brown-Golasinski sur la catégorie des ∞ -groupoïdes stricts (voir [7] et [4]). Nous avons pris soin de marquer clairement les

résultats qui utilisent cette structure afin d'insister sur le fait que le résultat principal n'en dépend pas.

Une brève section de ce texte est consacrée aux ∞ -groupeïdes quasi-stricts, c'est-à-dire aux ∞ -catégories admettant des inverses faibles. Cette notion a été introduite par Kapranov et Voedvosky dans [16]. Les deux auteurs étaient convaincus que les ∞ -groupeïdes quasi-stricts modélisaient les types d'homotopie. Il n'en est en fait rien, comme l'a démontré Simpson dans [22] (voir également le chapitre 4 de [23]). Nous exposons dans ce texte un argument alternatif. Nous montrons qu'il résulte de considérations bien connues que tout 3-groupeïde quasi-strict est faiblement équivalent, *via* un pseudo-foncteur, à un 3-groupeïde strict, et donc que les 3-types d'homotopie simplement connexes modélisés par les 3-groupeïdes stricts, ou quasi-stricts, sont les mêmes. On retrouve ainsi le résultat de Simpson, à savoir que le 3-type de la sphère de dimension 2 n'est pas modélisé par un 3-groupeïde quasi-strict.

Nous insistons sur le fait que ce texte ne répond pas à la question suggérée par son titre. En effet, la détermination de la classe des types d'homotopie modélisés par les ∞ -groupeïdes stricts reste à notre connaissance ouverte. Il en est de même de la question analogue pour les ∞ -groupeïdes quasi-stricts. En particulier, il n'est pas à notre connaissance connu si ceux-ci modélisent strictement plus de types d'homotopie que les ∞ -groupeïdes stricts.

Notre texte est organisé de la manière suivante. Dans la première section, nous rappelons la définition de ∞ -groupeïde strict et fixons la terminologie. Dans la seconde section, nous définissons les groupes d'homotopie des ∞ -groupeïdes stricts, ainsi que leurs équivalences faibles. Nous donnons différentes caractérisations de ces équivalences faibles. La troisième section est consacrée à la catégorie homotopique. On y définit notamment les notions de type d'homotopie et de n -type d'homotopie. La quatrième section est le cœur de ce texte. On y démontre, selon la stratégie exposée ci-dessus, que la catégorie homotopique des ∞ -groupeïdes simplement connexes est canoniquement équivalente à la catégorie dérivée $\mathcal{D}_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$. On définit une notion de ∞ -groupeïde d'Eilenberg-Mac Lane et on montre que tout ∞ -groupeïde simplement connexe est faiblement équivalent à un produit de ∞ -groupeïdes d'Eilenberg-Mac Lane. Dans la cinquième section, on définit une notion de foncteur de réalisation de Simpson et on démontre que les types d'homotopie simplement connexes modélisés par les ∞ -groupeïdes stricts, *via* un tel foncteur de réalisation, sont exactement les produits d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane. On en déduit qu'aucune sphère de dimension $n \geq 2$ n'est modélisée par un ∞ -groupeïde strict. Dans la sixième section, on définit les ∞ -groupeïdes quasi-stricts. On explique qu'il résulte de considérations bien connues que tout 3-groupeïde quasi-strict est faiblement équivalent, *via* un pseudo-foncteur, à un 3-groupeïde strict, et donc que les 3-types d'homotopie simplement connexes modélisés par les 3-groupeïdes stricts, ou quasi-stricts, sont les mêmes. Enfin, dans la dernière section, nous détaillons les deux questions exposées ci-dessus.

1. ∞ -groupoïdes stricts

1.1. — La catégorie des globes \mathbb{G} est la catégorie engendrée par le graphe

$$D_0 \xrightarrow[\tau_1]{\sigma_1} D_1 \xrightarrow[\tau_2]{\sigma_2} \cdots \xrightarrow[\tau_{i-1}]{\sigma_{i-1}} D_{i-1} \xrightarrow[\tau_i]{\sigma_i} D_i \xrightarrow[\tau_{i+1}]{\sigma_{i+1}} \cdots$$

soumis aux relations coglobulaires

$$\sigma_{i+1}\sigma_i = \tau_{i+1}\sigma_i \quad \text{et} \quad \sigma_{i+1}\tau_i = \tau_{i+1}\tau_i, \quad i \geq 1.$$

La catégorie des ∞ -graphes ou *ensembles globulaires* est la catégorie des préfaisceaux sur \mathbb{G} . Si X est un ∞ -graphe, on notera X_n l'ensemble $X(D_n)$ et s_i (resp. t_i) l'application $X(\sigma_i)$ (resp. $X(\tau_i)$). Ainsi, la donnée de X équivaut à celle d'un diagramme d'ensembles

$$\cdots \xrightarrow[t_{n+1}]{s_{n+1}} X_n \xrightarrow[t_n]{s_n} X_{n-1} \xrightarrow[t_{n-1}]{s_{n-1}} \cdots \xrightarrow[t_2]{s_2} X_1 \xrightarrow[t_1]{s_1} X_0$$

soumis aux relations globulaires

$$s_i s_{i+1} = s_i t_{i+1} \quad \text{et} \quad t_i s_{i+1} = t_i t_{i+1}, \quad i \geq 1.$$

Si X est un ∞ -graphe et i, j sont deux entiers tels que $i \geq j \geq 0$, on définit des applications $s_j^i, t_j^i : X_i \rightarrow X_j$ en posant

$$s_j^i = s_{j+1} \cdots s_{i-1} s_i \quad \text{et} \quad t_j^i = t_{j+1} \cdots t_{i-1} t_i.$$

Si X est un ∞ -graphe et n est un entier positif, on appellera X_n l'ensemble des *n-flèches* de X . Si $n = 0$, on appellera également X_0 l'ensemble des *objets* de X . Si u est une n -flèche pour $n \geq 1$, on appellera *source* (resp. *but*) de u , la $(n-1)$ -flèche $s_n(u)$ (resp. $t_n(u)$). Pour indiquer qu'une flèche u a pour source x et pour but y , on écrira $u : x \rightarrow y$. On dira que deux n -flèches u et v sont *parallèles* si, ou bien $n = 0$, ou bien $n \geq 1$ et u, v ont même source et même but.

1.2. — Soient X un ∞ -graphe, k un entier strictement positif et $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{k-1}$ des entiers positifs satisfaisant

$$j_l < i_l \quad \text{et} \quad j_l < i_{l+1}, \quad \text{pour } 1 \leq l \leq k-1.$$

On notera

$$X_{i_1} \times_{X_{j_1}} X_{i_2} \times_{X_{j_2}} \cdots \times_{X_{j_{k-1}}} X_{i_k}$$

la limite projective du diagramme d'ensembles

$$\begin{array}{ccccccc} X_{i_1} & & X_{i_2} & & \cdots & & X_{i_k} \\ & \searrow & & \swarrow & & & \swarrow \\ & s_{j_1}^{i_1} & & t_{j_1}^{i_2} & & & t_{j_{k-1}}^{i_k} \\ & & X_{j_1} & & X_{j_2} & \cdots & X_{j_{k-1}} \end{array}$$

1.3. — Une ∞ -précatégorie est un ∞ -graphe X muni d'applications

$$\begin{aligned} *_{j}^i : X_i \times_{X_j} X_i &\rightarrow X_i, \quad \text{pour } i > j \geq 0, \\ k_i : X_i &\rightarrow X_{i+1}, \quad \text{pour } i \geq 0, \end{aligned}$$

vérifiant les relations suivantes :

— pour tout couple (v, u) dans $X_i \times_{X_j} X_i$ avec $i > j \geq 0$, on a

$$s_i(v *_j^i u) = \begin{cases} s_i(u), & \text{si } j = i - 1; \\ s_i(v) *_j^{i-1} s_i(u), & \text{si } j < i - 1; \end{cases}$$

— pour tout couple (v, u) dans $X_i \times_{X_j} X_i$ avec $i > j \geq 0$, on a

$$t_i(v *_j^i u) = \begin{cases} t_i(v), & \text{si } j = i - 1; \\ t_i(v) *_j^{i-1} t_i(u), & \text{si } j < i - 1; \end{cases}$$

— pour tout u dans X_i avec $i \geq 0$, on a

$$s_{i+1}k_i(u) = u = t_{i+1}k_i(u).$$

Pour i et j deux entiers tels que $i \geq j \geq 0$, on notera

$$k_i^j = k_{i-1} \cdots k_{j+1} k_j.$$

Un *morphisme de ∞ -précatégories* est un morphisme de ∞ -graphes qui respecte les applications $*_i^j$ et k_i .

Une ∞ -précatégorie X est une ∞ -catégorie stricte si elle satisfait en outre les axiomes suivants :

— Associativité

pour tout triplet (w, v, u) dans $X_i \times_{X_j} X_i \times_{X_j} X_i$ avec $i > j \geq 0$, on a

$$(w *_j^i v) *_j^i u = w *_j^i (v *_j^i u);$$

— Loi d'échange

pour tout quadruplet $(\delta, \gamma, \beta, \alpha)$ dans

$$X_i \times_{X_j} X_i \times_{X_k} X_i \times_{X_j} X_i,$$

avec $i > j > k \geq 0$, on a

$$(\delta *_j^i \gamma) *_k^i (\beta *_j^i \alpha) = (\delta *_k^i \beta) *_j^i (\gamma *_k^i \alpha);$$

— Identités

pour tout u dans X_i avec $i \geq 1$ et tout j tel que $i > j \geq 0$, on a

$$u *_j^i k_i^j s_j^i(u) = u = k_i^j t_j^i(u) *_j^i u;$$

— Functorialité des identités

pour tout couple (v, u) dans $X_i \times_{X_j} X_i$ avec $i > j \geq 0$, on a

$$k_i(v *_j^i u) = k_i(v) *_j^{i+1} k_i(u).$$

On notera $\infty\text{-Cat}$ la sous-catégorie pleine de la catégorie des ∞ -précatégories dont les objets sont les ∞ -catégories strictes.

1.4. — Soient C une ∞ -catégorie stricte, u une i -flèche pour $i \geq 1$ et j un entier tel que $0 \leq j < i$. On dit que u admet un $*_j^i$ -inverse s'il existe une i -flèche v telle que

$$s_j^i(v) = t_j^i(u), \quad t_j^i(v) = s_j^i(u), \quad u *_j^i v = k_i^j(t_j^i(u)) \quad \text{et} \quad v *_j^i u = k_i^j(s_j^i(u)).$$

Le même argument qu'en théorie des groupes montre que si un tel v existe, il est unique. On appelle alors v le $*_j^i$ -inverse de u . Le $*_{i-1}^i$ -inverse de u (s'il existe) sera noté u^{-1} .

On dit qu'une ∞ -catégorie stricte C est un ∞ -groupeïde strict si pour tous entiers i, j tels que $0 \leq j < i$, toute i -flèche de C admet un $*_j^i$ -inverse. On notera $\infty\text{-Gpd}$ la sous-catégorie pleine de $\infty\text{-Cat}$ dont les objets sont les ∞ -groupeïdes stricts.

Proposition 1.5. — *Soit C une ∞ -catégorie stricte. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. C est un ∞ -groupeïde strict ;
2. C admet des $*_{i-1}^i$ -inverses pour tout $i \geq 1$;
3. C admet des $*_0^i$ -inverses pour tout $i \geq 1$;
4. pour tout $i \geq 1$, il existe un entier j tel que $0 \leq j < i$ pour lequel C admet des $*_j^i$ -inverses.

Démonstration. — Les implications $1 \Rightarrow 2$, $1 \Rightarrow 3$, $2 \Rightarrow 4$ et $3 \Rightarrow 4$ sont évidentes. Il s'agit donc de montrer l'implication $4 \Rightarrow 1$. Supposons 4 et fixons deux entiers i et j tels que $0 \leq j < i$. Nous allons montrer que C admet des $*_j^i$ -inverses par récurrence sur i . D'après 4, il existe un entier k tel que $0 \leq k < i$ pour lequel C admet des $*_k^i$ -inverses. On distingue trois cas :

- si $k = j$ (c'est nécessairement le cas si $i = 1$), alors C admet bien des $*_j^i$ -inverses ;
- si $k < j$, alors C admet des $*_k^j$ -inverses d'après l'hypothèse de récurrence appliquée à $j < i$;
- si $k > j$, alors C admet des $*_j^k$ -inverses d'après l'hypothèse de récurrence appliquée à $k < i$.

Pour conclure dans les deux derniers cas, il suffit de montrer que pour tous $i > j > k \geq 0$, si C admet des $*_k^j$ -inverses, alors C admet des $*_k^i$ -inverses si et seulement si C admet des $*_j^i$ -inverses. En utilisant le fait que le 2-graphe

$$C_i \begin{array}{c} \xrightarrow{s_j^i} \\ \xrightarrow{t_j^i} \end{array} C_j \begin{array}{c} \xrightarrow{s_k^j} \\ \xrightarrow{t_k^j} \end{array} C_k$$

est naturellement muni d'une structure de 2-catégorie stricte, on se ramène au cas $k = 0$, $j = 1$ et $i = 2$. Le résultat est alors une conséquence du lemme suivant. \square

Lemme 1.6. — *Soit C une 2-catégorie stricte dont les 1-flèches sont inversibles. Alors une 2-flèche de C est inversible pour la composition horizontale (c'est-à-dire $*_0^2$) si et seulement si elle est inversible pour la composition verticale (c'est-à-dire $*_1^2$).*

Démonstration. — Soit $\alpha : u \rightarrow v$ une 2-flèche de C . Si α admet un inverse α^* pour la composition horizontale, alors on vérifie immédiatement que $v *_0 \alpha^* *_0 u$ est un inverse pour la composition verticale. Réciproquement, si α admet un inverse α^{-1} pour la composition verticale, alors $v^{-1} *_0 \alpha^{-1} *_0 u^{-1}$ est un inverse pour la composition horizontale. \square

2. Équivalences faibles de ∞ -groupeïdes stricts

2.1. — Soient G un ∞ -groupeïde strict et u, v deux n -flèches pour $n \geq 0$. Une homotopie de u vers v est une $(n + 1)$ -flèche $u \rightarrow v$. Si une telle homotopie existe, on dira que u est

homotope à v et on écrira $u \sim_n v$. Par définition, si u est homotope à v , alors u et v sont parallèles.

Lemme 2.2. — *Soit G un ∞ -groupeïde strict. Pour tout $n \geq 0$, la relation \sim_n est une relation d'équivalence. De plus, si $n \geq 1$, cette relation est compatible avec la composition $*_{n-1}^n$.*

Démonstration. — Soit u une n -flèche de G . La $(n+1)$ -flèche $k_n(u)$ est une homotopie de u vers u . La relation \sim_n est donc réflexive.

Soit maintenant v une deuxième n -flèche de G et soit $h : u \rightarrow v$ une homotopie. La $(n+1)$ -flèche h^{-1} est une homotopie de v vers u . La relation \sim_n est donc symétrique.

Soit maintenant w une troisième n -flèche de G et $k : v \rightarrow w$ une deuxième homotopie. La $(n+1)$ -flèche $k *_{n-1}^{n+1} h$ est une homotopie de u vers w . La relation \sim_n est donc transitive.

Enfin, soit

$$\begin{array}{ccc} u & & v \\ \Downarrow h & & \Downarrow k \\ u' & & v' \end{array}$$

un diagramme dans G , où les flèches simples sont des n -flèches avec $n \geq 1$ et les flèches doubles sont des $(n+1)$ -flèches. La $(n+1)$ -flèche $k *_{n-1}^{n+1} h$ est une homotopie de $v *_{n-1}^{n+1} u$ vers $v' *_{n-1}^{n+1} u'$. La relation \sim_n est donc compatible avec la composition $*_{n-1}^n$. \square

2.3. — Soit G un ∞ -groupeïde strict. Pour $n \geq 0$, on notera \overline{G}_n le quotient de G_n par la relation d'équivalence \sim_n .

Fixons maintenant $n \geq 1$. Les applications

$$s_n, t_n : G_n \rightarrow G_{n-1}, \quad k_{n-1} : G_{n-1} \rightarrow G_n,$$

induisent des applications

$$s_n, t_n : \overline{G}_n \rightarrow G_{n-1}, \quad k_{n-1} : G_{n-1} \rightarrow \overline{G}_n.$$

De plus, par le lemme ci-dessus, l'application

$$*_{n-1}^n : G_n \times_{G_{n-1}} G_n \rightarrow G_n$$

induit une application

$$*_{n-1}^n : \overline{G}_n \times_{G_{n-1}} \overline{G}_n \rightarrow \overline{G}_n.$$

Il est immédiat que le graphe

$$\overline{G}_n \begin{array}{c} \xrightarrow{s_n} \\ \xrightarrow{t_n} \end{array} G_{n-1},$$

muni des applications

$$*_{n-1}^n : \overline{G}_n \times_{G_{n-1}} \overline{G}_n \rightarrow \overline{G}_n \quad \text{et} \quad k_{n-1} : G_{n-1} \rightarrow \overline{G}_n$$

définit un groupeïde. Nous noterons $\varpi_n(G)$ ce groupeïde.

On vérifie facilement que ϖ_n définit un foncteur de la catégorie des ∞ -groupeïdes stricts vers la catégorie des groupeïdes.

2.4. — Soit G un ∞ -groupeïde strict. L'ensemble des *composantes connexes* de G est l'ensemble

$$\pi_0(G) = \pi_0(\varpi_1(G)) = \overline{G_0}.$$

Soient $n \geq 1$ et u, v deux $(n-1)$ -flèches parallèles de G . On notera

$$\pi_n(G, u, v) = \mathbf{Hom}_{\varpi_n(G)}(u, v) \quad \text{et} \quad \pi_n(G, u) = \pi_n(G, u, u).$$

La composition de $\varpi_n(G)$ induit une structure de groupe sur $\pi_n(G, u)$.

Si $n \geq 1$ et x est un objet de G , le n -ième *groupe d'homotopie* de (G, x) est le groupe

$$\pi_n(G, x) = \pi_n(G, k_{n-1}^0(x)).$$

L'argument de Eckmann-Hilton montre que ce groupe est abélien dès que $n \geq 2$.

On déduit de la functorialité de ϖ_n que :

- π_0 définit un foncteur de la catégorie des ∞ -groupeïdes stricts vers la catégorie des ensembles ;
- pour $n \geq 1$, π_n définit un foncteur de la catégorie des ∞ -groupeïdes stricts munis d'une $(n-1)$ -flèche (ou d'un objet) vers la catégorie des groupes.

2.5. — Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de ∞ -groupeïdes stricts. On dira que f est une *équivalence faible de ∞ -groupeïdes stricts* si

- l'application $\pi_0(f) : \pi_0(G) \rightarrow \pi_0(H)$ est une bijection ;
- pour tout $n \geq 1$ et tout objet x de G , le morphisme $\pi_n(f, x) : \pi_n(G, x) \rightarrow \pi_n(H, f(x))$ est un isomorphisme.

Proposition 2.6. — *Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de ∞ -groupeïdes stricts. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *f est une équivalence faible ;*
2. *l'application $\pi_0(f) : \pi_0(G) \rightarrow \pi_0(H)$ est une bijection, et pour tout $n \geq 1$ et toute $(n-1)$ -flèche u de G , le morphisme f induit un isomorphisme*

$$\pi_n(G, u) \rightarrow \pi_n(H, f(u)) ;$$

3. *le foncteur $\varpi_1(f) : \varpi_1(G) \rightarrow \varpi_1(H)$ est une équivalence de catégories, et pour tout $n \geq 2$ et tout couple (u, v) de $(n-1)$ -flèches parallèles de G , le morphisme f induit une bijection*

$$\pi_n(G, u, v) \rightarrow \pi_n(H, f(u), f(v)) ;$$

4. *le foncteur $\varpi_1(f) : \varpi_1(G) \rightarrow \varpi_1(H)$ est plein et essentiellement surjectif, et pour tout $n \geq 2$ et tout couple (u, v) de $(n-1)$ -flèches parallèles de G , le morphisme f induit une surjection*

$$\pi_n(G, u, v) \rightarrow \pi_n(H, f(u), f(v)).$$

Démonstration. — L'implication $2 \Rightarrow 1$ est évidente. Montrons la réciproque. Le cas $n = 1$ est évident. Soient $n \geq 2$ et u une $(n-1)$ -flèche de G . Posons $x = s_0^{n-1}(u)$. On définit un isomorphisme

$$\pi_n(G, x) \rightarrow \pi_n(G, u)$$

en envoyant une n -flèche $v : k_{n-1}^0(x) \rightarrow k_{n-1}^0(x)$ sur la n -flèche $k_{n-1}(u) *_{0}^n v : u \rightarrow u$. Il est immédiat que le morphisme f commute à cet isomorphisme, c'est-à-dire que le carré

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(G, x) & \longrightarrow & \pi_n(G, u) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_n(H, f(x)) & \longrightarrow & \pi_n(H, f(u)) \end{array}$$

est commutatif. Le morphisme $\pi_n(G, u) \rightarrow \pi_n(H, f(u))$ est donc un isomorphisme pour $n \geq 2$.

L'implication $3 \Rightarrow 2$ est évidente. Montrons la réciproque. Soient $n \geq 1$ et u, v deux $(n-1)$ -flèches parallèles de G . Supposons qu'il existe une n -flèche $\alpha : u \rightarrow v$ dans G . On définit alors une bijection

$$\pi_n(G, u) \rightarrow \pi_n(G, u, v)$$

en envoyant une n -flèche $\beta : u \rightarrow u$ sur la n -flèche $\alpha *_{n-1}^n \beta : u \rightarrow v$. Il est immédiat que le morphisme f commute à cette bijection, c'est-à-dire que le carré

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(G, u) & \longrightarrow & \pi_n(G, u, v) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_n(H, f(u)) & \longrightarrow & \pi_n(H, f(u), f(v)) \end{array}$$

est commutatif. Ainsi, pour conclure, il suffit de montrer que s'il existe une n -flèche $f(u) \rightarrow f(v)$ dans H , alors il existe une n -flèche $u \rightarrow v$ dans G . C'est clair pour $n = 1$ par injectivité de $\pi_0(f)$. Soit donc $n \geq 2$ et $\beta : f(u) \rightarrow f(v)$ une n -flèche de H . Posons $x = s_{n-1}(u)$. La n -flèche $k_{n-1}(f(u)^{-1}) *_{n-2}^n \beta$ de H a pour source $f(u)^{-1} *_{n-2}^{n-1} f(u) : f(u) \rightarrow f(u)$ et pour but $f(u)^{-1} *_{n-2}^{n-1} f(v) : f(u) \rightarrow f(v)$. Puisque l'application

$$\pi_{n-1}(G, x) \rightarrow \pi_{n-1}(H, f(x))$$

est injective, les deux $(n-1)$ -flèches $u^{-1} *_{n-2}^{n-1} u$ et $u^{-1} *_{n-2}^{n-1} v$ sont égales dans $\pi_{n-1}(G, x)$. Puisque $\varpi_{n-1}(G)$ est un groupoïde, cela entraîne que $u = v$ dans $\pi_{n-1}(G, x, y)$ et donc qu'il existe une n -flèche de G de u vers v .

L'implication $3 \Rightarrow 4$ est évidente. Montrons la réciproque. Soient $n \geq 1$, u, v deux $(n-1)$ -flèches parallèles de G et α, β deux n -flèches de u vers v . Supposons qu'on ait $f(\alpha) = f(\beta)$ dans $\pi_n(H, f(u), f(v))$. Il existe alors une $(n+1)$ -flèche de H de $f(\alpha)$ vers $f(\beta)$. Par surjectivité de l'application

$$\pi_{n+1}(G, \alpha, \beta) \rightarrow \pi_{n+1}(H, f(\alpha), f(\beta)),$$

il existe une $(n+1)$ -flèche de G de α vers β . D'où $\alpha = \beta$ dans $\pi_n(G, u, v)$. \square

Remarque 2.7. — La dernière condition se reformule en la conjonction des propriétés suivantes :

- pour tout objet y de H , il existe un objet x de G tel que $f(x)$ et y soient homotopes ;
- pour tout entier $n \geq 0$, tout couple (u, v) de n -flèches parallèles de G et toute $(n+1)$ -flèche $\beta : f(u) \rightarrow f(v)$ de H , il existe une $(n+1)$ -flèche $\alpha : u \rightarrow v$ de G telle que $f(\alpha)$ soit homotope à β .

C'est exactement la notion d'équivalence faible de ∞ -catégories strictes exposée dans [18], restreinte aux ∞ -groupoïdes stricts.

3. La catégorie homotopique

3.1. — Un *localisateur* est la donnée d'une catégorie \mathcal{C} et d'une classe de flèches \mathcal{W} de \mathcal{C} . On notera $(\mathcal{C}, \mathcal{W})$ un tel localisateur et on appellera \mathcal{W} la classe des *équivalences faibles*.

La donnée d'un localisateur est suffisante pour définir les notions importantes de la théorie de l'homotopie (comme par exemple, les notions de catégorie homotopique, de limites homotopiques et de foncteurs dérivés).

Si $(\mathcal{C}, \mathcal{W})$ est un localisateur, la *catégorie homotopique* de $(\mathcal{C}, \mathcal{W})$ est la localisation de Gabriel-Zisman de \mathcal{C} par \mathcal{W} , c'est-à-dire la catégorie obtenue à partir de \mathcal{C} en inversant formellement les flèches de \mathcal{W} . On notera cette catégorie $\mathrm{Ho}_{\mathcal{W}}(\mathcal{C})$ ou $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ si le contexte rend claire la classe \mathcal{W} .

A priori, l'existence de la catégorie $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ nécessite un changement d'univers (au sens de Grothendieck). Cependant, dans tous les exemples que nous considérerons, la catégorie $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ existera sans changement d'univers.

Exemples 3.2. —

1. Soient $\mathcal{C} = \mathcal{Top}$ la catégorie des espaces topologiques et \mathcal{W}_{∞} la classe des équivalences faibles topologiques, c'est-à-dire des applications continues $f : X \rightarrow Y$ vérifiant les propriétés suivantes :

- l'application $\pi_0(f) : \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ est une bijection ;
- pour tout x dans X et tout $i \geq 1$, le morphisme $\pi_i(f, x) : \pi_i(X, x) \rightarrow \pi_i(Y, f(x))$ est un isomorphisme.

La *catégorie homotopique* \mathbf{Hot} est la catégorie $\mathrm{Ho}_{\mathcal{W}_{\infty}}(\mathcal{Top})$. Un *type d'homotopie* est un objet de \mathbf{Hot} à isomorphisme canonique près.

2. Fixons un entier $n \geq 0$. Soient $\mathcal{C} = \mathcal{Top}$ et \mathcal{W}_n la classe des n -équivalences faibles topologiques, c'est-à-dire des applications continues $f : X \rightarrow Y$ vérifiant les propriétés suivantes :

- l'application $\pi_0(f) : \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ est une bijection ;
- pour tout x dans X et tout i tel que $1 \leq i \leq n$, le morphisme de groupes $\pi_i(f, x) : \pi_i(X, x) \rightarrow \pi_i(Y, f(x))$ est un isomorphisme.

La *catégorie des n -types d'homotopie* \mathbf{Hot}_n est la catégorie $\mathrm{Ho}_{\mathcal{W}_n}(\mathcal{Top})$. Un *n -type d'homotopie* est un objet de \mathbf{Hot} à isomorphisme canonique près.

3. Soit $n \geq 0$. Notons $\mathcal{Top}_{\leq n}$ la sous-catégorie pleine de \mathcal{Top} constituée des espaces topologiques possédant la propriété suivante : pour tout $i > n$ et tout x dans X , le groupe $\pi_i(X, x)$ est trivial. Cette catégorie sera munie dans la suite des équivalences faibles topologiques (qui coïncide évidemment avec les n -équivalences faibles)

4. La catégorie \mathbf{CW} des CW-complexes sera dans la suite munie des équivalences d'homotopie entre CW-complexes (qui sont également les équivalences faibles topologiques entre CW-complexes par un théorème de Whitehead).

5. La catégorie $\widehat{\Delta}$ des ensembles simpliciaux sera dans la suite munie des équivalences faibles d'ensembles simpliciaux, c'est-à-dire des morphismes d'ensembles simpliciaux qui s'envoient *via* le foncteur réalisation géométrique $|\cdot|$ sur une équivalence d'homotopie entre CW-complexes.

6. La catégorie \mathbf{Cat} des petites catégories sera dans la suite munie des équivalences faibles de catégories, c'est-à-dire des foncteurs s'envoyant *via* le foncteur nerf N sur une équivalence faible d'ensembles simpliciaux.

7. La catégorie $\infty\text{-Gpd}$ des ∞ -groupeïdes stricts sera dans la suite munie des équivalences faibles de ∞ -groupeïdes stricts (qui ont été définies dans la section précédente).

8. Soient \mathcal{A} une catégorie abélienne et k dans $\mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$. On notera $C_{\geq k}(\mathcal{A})$ la catégorie des complexes homologiques d'objets de \mathcal{A} en degré supérieur ou égal à k . Cette catégorie sera munie dans la suite des quasi-isomorphismes, c'est-à-dire des morphismes de complexes induisant des isomorphismes en homologie.

La catégorie $\text{Ho}(C_{\geq k}(\mathcal{A}))$ n'est rien d'autre que la catégorie dérivée $D_{\geq k}(\mathcal{A})$ de \mathcal{A} .

Theorème 3.3. — *La chaîne de foncteurs*

$$\text{Cat} \xrightarrow{N} \widehat{\Delta} \xrightarrow{|\cdot|} \text{CW} \hookrightarrow \text{Top}$$

induit une chaîne d'équivalences de catégories

$$\text{Ho}(\text{Cat}) \xrightarrow{\overline{N}} \text{Ho}(\widehat{\Delta}) \xrightarrow{|\cdot|} \text{Ho}(\text{CW}) \rightarrow \text{Ho}(\text{Top}) = \text{Hot}.$$

Démonstration. — Voir le corollaire 3.3.1 du chapitre VI de [14] pour \overline{N} . Pour les deux autres foncteurs, voir [21] ou le chapitre VII de [10]. \square

Remarque 3.4. — Par le théorème précédent, on dispose donc de quatre définitions équivalentes de Hot . De même, un théorème similaire donne quatre définitions équivalentes de Hot_n . Le choix des définitions utilisant Cat est à la base de la théorie des catégories test de Grothendieck exposée dans [12] et [20].

3.5. — Les propriétés universelles de Hot et Hot_n entraînent l'existence d'un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Ho}(\text{Top}_{\leq n}) & \xrightarrow{I} & \text{Hot} \\ & \searrow J & \swarrow K \\ & & \text{Hot}_n \end{array}$$

Des résultats classiques de la théorie de l'homotopie montrent que I est pleinement fidèle et que J est une équivalence de catégories. Ainsi, on peut identifier la catégorie Hot_n à la sous-catégorie pleine de Hot dont les objets proviennent de $\text{Top}_{\leq n}$.

Si X est un type d'homotopie, on appellera $K(X)$ le n -type d'homotopie associé à X . On pourra le voir comme un objet de Hot via l'identification que l'on vient de décrire.

4. La catégorie homotopique des ∞ -groupeïdes stricts simplement connexes

4.1. — On dira qu'un ∞ -groupeïde strict G est *0-connexe* s'il a exactement une composante connexe. On dira que G est *simplement connexe* s'il est 0-connexe et si pour tout objet x de G , le groupe $\pi_1(G, x)$ est trivial. On notera $\infty\text{-Gpd}_{\text{sc}}$ la sous-catégorie pleine de $\infty\text{-Gpd}$ formée des ∞ -groupeïdes simplement connexes.

Soit k un entier positif. On dira qu'un ∞ -groupeïde strict G est *k -réduit* si pour tout $l \leq k$, G possède une unique l -flèche. On notera $\infty\text{-Gpd}_{\geq k+1}$ la sous-catégorie pleine de $\infty\text{-Gpd}$ dont les objets sont les ∞ -groupeïdes k -réduits.

Proposition 4.2. — *Pour tout ∞ -groupeïde strict simplement connexe G , il existe un ∞ -groupeïde strict 1-réduit G' et une équivalence faible de G' vers G . En particulier, le foncteur $\mathrm{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}) \rightarrow \mathrm{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\mathrm{sc}})$, induit par le foncteur d'inclusion de $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}$ dans $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\mathrm{sc}}$, est essentiellement surjectif.*

Démonstration. — Soit G un ∞ -groupeïde strict simplement connexe. Le choix d'un objet de x de G détermine un sous- ∞ -groupeïde G' de G défini de la manière suivante : $G'_0 = \{x\}$, $G'_1 = \{k_1^0(x)\}$ et pour $n \geq 2$, G'_n est l'ensemble des n -flèches f de G telles que $s_1^n(f) = k_1^0(x) = t_1^n(f)$. L'inclusion $G' \rightarrow G$ est clairement une équivalence faible. \square

Remarque 4.3. — Le foncteur $\mathrm{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}) \rightarrow \mathrm{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\mathrm{sc}})$ est en fait une équivalence de catégories. Par la proposition précédente, il suffit de montrer que ce foncteur est pleinement fidèle. Cela résulte de l'existence de la structure de catégorie de modèles de Brown-Golasiński sur $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}$ (voir [7] et [4]) et du fait que les sous-catégories $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}$ et $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\mathrm{sc}}$ admettent des remplacements cofibrants et fibrants pour cette structure.

4.4. — On notera \mathbf{Ab} la catégorie des groupes abéliens et $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}(\mathbf{Ab})$ la catégorie des ∞ -groupeïdes stricts en groupes abéliens, c'est-à-dire des objets ∞ -groupeïdes stricts dans la catégorie des groupes abéliens. Par définition, un objet G de $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}(\mathbf{Ab})$ est un ∞ -groupeïde strict dont, pour tout $n \geq 0$, l'ensemble des flèches G_n est muni d'une structure de groupe abélien, et dont tous les morphismes structuraux sont des morphismes de groupes abéliens. On notera $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ la catégorie des ∞ -groupeïdes stricts en groupes abéliens 1-réduits. Le foncteur d'oubli de la catégorie des groupes abéliens vers la catégorie des ensembles induit un foncteur $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{Gpd}$ qui envoie un ∞ -groupeïde strict en groupes abéliens sur son ∞ -groupeïde strict sous-jacent. Ce foncteur se restreint en un foncteur $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}$.

Proposition 4.5. — *Le foncteur $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}$ est un isomorphisme de catégories.*

Démonstration. — Pour démontrer la proposition, il suffit de prouver que tout ∞ -groupeïde strict 1-réduit est canoniquement un ∞ -groupeïde en groupes abéliens et que les morphismes de ∞ -groupeïdes stricts préservent cette structure abélienne.

Soit donc G un tel ∞ -groupeïde. Notons e_ε l'unique ε -flèche de G pour $\varepsilon = 0, 1$. Soit $i \geq 2$. Si u et v sont deux i -flèches de G , alors

$$s_\varepsilon^i(u) = t_\varepsilon^i(u) = s_\varepsilon^i(v) = t_\varepsilon^i(v) = e_\varepsilon$$

pour $\varepsilon = 0, 1$. L'ensemble des i -flèches est donc muni de deux structures de groupes, induites par les compositions $*_0^i$ et $*_1^i$. Par la loi de l'échange, ces deux opérations sont compatibles. De plus, elles ont la même unité puisque $k_i^0(e_0) = k_i^1(e_1)$. Par l'argument d'Eckmann-Hilton, ces deux lois sont égales et commutatives. On notera $+$ cette opération. Le groupe $(G_i, +)$ est donc abélien.

Vérifions que les données de G sont compatibles avec cette structure abélienne. Supposons toujours $i \geq 2$ et soient u, v deux i -flèches. On a

$$s_i(u + v) = s_i(u *_0^i v) = s_i(u) *_0^{i-1} s_i(v) = s_i(u) + s_i(v).$$

L'application $s_i : G_i \rightarrow G_{i-1}$ est donc un morphisme de groupes. Il en est de même de l'application t_i . Soient j tel que $0 \leq j < i$ et u', v' deux autres i -flèches vérifiant

$s_j^i(u) = t_j^i(v)$ et $s_j^i(u') = t_j^i(v')$. On a

$$(u + u') *_{j}^i(v + v') = (u *_{0}^i u') *_{j}^i(v *_{0}^i v') = (u *_{j}^i v) *_{0}^i(u' *_{j}^i v') = (u *_{j}^i v) + (u' *_{j}^i v').$$

Ainsi $*_{j}^i$ est un morphisme de groupes. Supposons maintenant $i \geq 0$ et soient u, v deux i -flèches. On a

$$k_i(u + v) = k_i(u *_{0}^i v) = k_i(u) *_{0}^{i+1} k_i(v) = k_i(u) + k_i(v)$$

et k_i est un morphisme de groupes.

Montrons maintenant que cette structure abélienne est unique. Donnons-nous donc une structure de ∞ -groupeïde strict en groupes abéliens sur G . Fixons $i \geq 2$ et notons $+$ ' la loi de groupe sur G_i de cette structure. Puisque l'application k_i^0 respecte la loi $+$ ', l'unité de $+$ ' est $k_i^0(e_0)$. En particulier, $+$ ' et $*_{0}^i$ ont même unité. Par ailleurs, puisque l'application $*_{0}^i : G_i \times G_i \rightarrow G_i$ respecte la loi $+$ ', les lois $+$ ' et $*_{0}^i$ sont compatibles. Par l'argument d'Eckmann-Hilton, elles sont donc égales. Ainsi, la structure abélienne est uniquement déterminée par les compositions $*_{0}^i$.

De plus, puisque $+ = *_{0}^i$, un morphisme de ∞ -groupeïdes stricts 1-réduits est automatiquement un morphisme de ∞ -groupeïdes stricts en groupes abéliens. \square

4.6. — Nous allons maintenant montrer que la catégorie des ∞ -groupeïdes stricts en groupes abéliens est canoniquement équivalente à la catégorie $C_{\geq 0}(\mathbf{Ab})$ des complexes de groupes abéliens en degré homologique positif (ce résultat a été établi par Bourn dans [6]).

Soit C un tel complexe. Notons $d_i : C_i \rightarrow C_{i-1}$ sa différentielle. On associe à C un ∞ -groupeïde strict en groupes abéliens G défini de la manière suivante :

- le groupe G_i des i -flèches est $C_i \oplus C_{i-1} \oplus \cdots \oplus C_0$;
- pour $i \geq 1$, le morphisme $s_i : G_i = C_i \oplus G_{i-1} \rightarrow G_{i-1}$ est la projection canonique ;
- pour $i \geq 1$, le morphisme $t_i : G_i = C_i \oplus G_{i-1} \rightarrow G_{i-1}$ est la somme de d_i et de la projection canonique ;
- pour $i \geq 0$, le morphisme $k_i : G_i \rightarrow G_{i+1} = C_{i+1} \oplus G_i$ est l'injection canonique ;
- pour $i > j \geq 0$, le morphisme $*_{j}^i : G_i \times_{G_j} G_i \rightarrow G_i$ est défini par

$$(x_i, \dots, x_0) *_{j}^i(y_i, \dots, y_0) = (x_i + y_i, \dots, x_{j+1} + y_{j+1}, y_j, \dots, y_0)$$

(notons que $(x_i, \dots, x_0, y_i, \dots, y_0)$ appartient à $G_i \times_{G_j} t_j^i$ si et seulement si on a $(x_j, \dots, x_0) = (d_{j+1}(y_{j+1}) + y_j, y_{j-1}, \dots, y_0)$).

On vérifie facilement que G est bien un ∞ -groupeïde strict en groupes abéliens. Pour $i > j \geq 0$, le $*_{j}^i$ -inverse d'un élément (x_i, \dots, x_0) de G_i est donné par

$$(-x_i, \dots, -x_{j+1}, d_{j+1}(x_{j+1}) + x_j, x_{j-1}, \dots, x_0).$$

De plus, si $f : C \rightarrow C'$ est un morphisme de complexes, les composantes $f_k : C_k \rightarrow C'_k$ induisent pour tout i positif, un morphisme $G_i = C_i \oplus \cdots \oplus C_0 \rightarrow G'_i = C'_i \oplus \cdots \oplus C'_0$. On vérifie facilement que ces morphismes définissent un morphisme de ∞ -groupeïdes stricts en groupes abéliens. On vient ainsi de définir un foncteur $C_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd}(\mathbf{Ab})$.

Proposition 4.7. — *Le foncteur $C_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd}(\mathbf{Ab})$ défini ci-dessus est une équivalence de catégories.*

Démonstration. — Soit G un ∞ -groupeïde strict en groupes abéliens. Posons $C_0 = G_0$ et $C_i = \text{Ker } s_i$ pour $i \geq 1$. Puisque le morphisme $s_i : G_i \rightarrow G_{i-1}$ admet k_{i-1} comme section, G_i est canoniquement isomorphe à $C_i \oplus G_{i-1}$. Ainsi, on a montré que l'ensemble globulaire sous-jacent à G est isomorphe à un ∞ -graphe en groupes abéliens de la forme

$$C_0 \underset{t_1}{\overset{s_1}{\rightrightarrows}} C_1 \oplus C_0 \underset{t_2}{\overset{s_2}{\rightrightarrows}} \cdots \underset{t_i}{\overset{s_i}{\rightrightarrows}} C_i \oplus C_{i-1} \oplus \cdots \oplus C_0 \underset{t_{i+1}}{\overset{s_{i+1}}{\rightrightarrows}} \cdots$$

À travers cet isomorphisme, s_i devient la projection canonique $C_i \oplus G_{i-1} \rightarrow G_{i-1}$, et k_{i-1} l'inclusion canonique $G_{i-1} \rightarrow C_i \oplus G_{i-1}$. Puisque k_{i-1} est également une section de t_i , pour $(0, y)$ dans $C_i \oplus G_{i-1}$, on a $t_i(0, y) = y$. Par ailleurs, l'identité $s_{i-1}t_i = s_{i-1}s_i$ entraîne que, pour $(x, 0)$ dans $C_i \oplus G_{i-1}$, on a $t_i(x, 0) = (d_i(x), 0)$, où d_i est un morphisme de C_i vers C_{i-1} . Ainsi, t_i est la somme de la projection canonique et de ce morphisme d_i . L'identité $t_{i-1}t_i = t_{i-1}s_i$ implique immédiatement qu'on a $d_{i-1}d_i = 0$. On a ainsi associé un complexe (C, d) à G .

On montre de même que si $g : G \rightarrow G'$ est un morphisme de ∞ -groupeïdes stricts en groupes abéliens, le morphisme $g_i : G_i \rightarrow G'_i$ se décompose en une somme de deux morphismes $f_i \oplus g_{i-1} : C_i \oplus G_{i-1} \rightarrow C'_i \oplus G'_{i-1}$ et que les morphismes f_i définissent un morphisme de complexes.

On a donc construit un foncteur $\Psi : \infty\text{-}\mathcal{Gpd}(\text{Ab}) \rightarrow C_{\geq 0}(\text{Ab})$. Montrons que celui-ci est un quasi-inverse du foncteur $K : C_{\geq 0}(\text{Ab}) \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{Gpd}(\text{Ab})$ de l'énoncé. Il est évident que $\Psi\Phi$ est isomorphe à l'identité. Montrons que $\Phi\Psi$ est isomorphe à l'identité. Soit donc G un ∞ -groupeïde strict en groupes abéliens. On a déjà montré que $(\Phi\Psi)(G)$ et G ont des ensembles globulaires sous-jacents canoniquement isomorphes et que cette isomorphisme est compatible avec les identités. Pour conclure, il suffit de montrer que ces données suffisent à déterminer les composition $*_j^i$.

Soient donc C un complexe et $i > j \geq 0$ deux entiers. Soit $(x_i, \dots, x_0, y_i, \dots, y_0)$ un élément de $G_i \times_{G_j} G_i$. Rappelons que cela signifie que les relations

$$x_j = d_{j+1}(y_{j+1}) + y_j \quad \text{et} \quad x_i = y_i, \quad \text{pour } 0 \leq i < j,$$

sont satisfaites. On a alors

$$\begin{aligned} & (x_i, \dots, x_0) *_j^i (y_i, \dots, y_0) \\ &= (x_i, \dots, x_{j+1}, d_{j+1}(y_{j+1}) + y_j, y_{j-1}, \dots, y_0) *_j^i (y_i, \dots, y_0) \\ &= (x_i, \dots, x_{j+1}, 0, \dots, 0) *_j^i (0, \dots, 0) + \\ & \quad (0, \dots, 0, d_{j+1}(y_{j+1}) + y_j, y_{j-1}, \dots, y_0) *_j^i (y_i, \dots, y_0) \\ &= (x_i, \dots, x_{j+1}, 0, \dots, 0) + (y_i, \dots, y_0) \\ &= (x_i + y_i, \dots, x_{j+1} + y_{j+1}, y_j, \dots, y_0), \end{aligned}$$

où l'avant dernière égalité résulte des égalités

$$\begin{aligned} (0, \dots, 0) &= k_i^j(s_j^i(x_i, \dots, x_{j+1}, 0, \dots, 0)), \\ (0, \dots, 0, d_{j+1}(y_{j+1}) + y_j, y_{j-1}, \dots, y_0) &= k_i^j(t_j^i(y_i, \dots, y_0)), \end{aligned}$$

et de l'axiome des identités. □

Proposition 4.8. — Dans l'équivalence de catégories $C_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-Gpd}(\mathbf{Ab})$ de la proposition précédente, les quasi-isomorphismes et les équivalences faibles de ∞ -groupoïdes sont échangés.

Démonstration. — Soit G un ∞ -groupoïde strict en groupes abéliens et $n \geq 1$. Rappelons qu'on note \sim_n la relation d'équivalence d'homotopie des n -flèches. Si x est un objet de G , l'application $G_n \rightarrow G_n$, qui à f associe $f - k_{n-1}^0(x)$, induit un isomorphisme de groupes de $\pi_n(G, x)$ vers $\pi_n(G, 0)$. Par ailleurs, on a

$$\begin{aligned} \pi_n(G, 0) &\simeq \{f \in G_n; s_n(f) = t_n(f) = 0\} / \sim_n \\ &= \{f \in G_n; s_n(f) = t_n(f) = 0\} / \{f \in G_n; f \sim_n 0\} \\ &= \{f \in G_n; s_n(f) = t_n(f) = 0\} / \{t_{n+1}(h); h \in G_{n+1}, s_{n+1}(h) = 0\} \\ &\simeq \{(f, 0) \in C_n \oplus G_{n-1}; d_n(f) = 0\} / \{d_{n+1}(h); (h, 0) \in C_{n+1} \oplus G_n\} \\ &\simeq \{f \in C_n; d_n(f) = 0\} / \{d_{n+1}(h); h \in C_{n+1}\} \\ &= \text{Ker}(d_n) / \text{Im}(d_{n+1}) \\ &= H_n(C(G)). \end{aligned}$$

De même, on montre que $\pi_0(G) \simeq H_0(C(G))$.

La proposition résulte de la naturalité de ces isomorphismes. \square

Corollaire 4.9. — L'équivalence de catégories $C_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-Gpd}(\mathbf{Ab})$ induit une équivalence de catégories $D_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \text{Ho}(\infty\text{-Gpd}(\mathbf{Ab}))$.

Remarque 4.10. — Soit $k \geq 0$. L'équivalence de catégories $C_{\geq 0}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-Gpd}(\mathbf{Ab})$ se restreint en une équivalence de catégories $C_{\geq k}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-Gpd}_{\geq k}(\mathbf{Ab})$ et celle-ci induit une équivalence de catégories $D_{\geq k}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \text{Ho}(\infty\text{-Gpd}_{\geq k}(\mathbf{Ab}))$.

Corollaire 4.11. — On a une équivalence de catégories canonique $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \infty\text{-Gpd}_{\geq 2}$. Celle-ci induit une équivalence de catégories $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab}) \rightarrow \text{Ho}(\infty\text{-Gpd}_{\geq 2})$.

Démonstration. — Cela résulte de la remarque ci-dessus et de la proposition 4.5. \square

Remarque 4.12. — D'après la remarque 4.3 et le corollaire précédent, les catégories $\text{Ho}(\infty\text{-Gpd}_{\text{sc}})$ et $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ sont canoniquement équivalentes.

4.13. — Soient A un groupe abélien et n un entier positif. On notera $A[n]$ le complexe de groupes abéliens concentré en degré homologique n de valeur A . Si $n \geq 2$, on notera $\mathcal{K}(A, n)$ le ∞ -groupoïde strict image de $A[n]$ par l'équivalence de catégories du corollaire ci-dessus. On peut décrire explicitement $\mathcal{K}(A, n)$ de la manière suivante :

- $\mathcal{K}(A, n)$ a un unique objet e ;
- l'ensemble des i -flèches de $\mathcal{K}(A, n)$ est le singleton $\{e\}$ pour $i < n$ (on notera 0 ce singleton), et est A pour $i \geq n$;
- les applications s_i et t_i sont égales et valent l'identité 1_0 pour $i < n$, la projection $A \rightarrow 0$ pour $i = n$, et l'identité 1_A pour $i \geq n + 1$;
- l'application k_i vaut 1_0 pour $i < n - 1$, l'application $0 \rightarrow A$ correspondant à l'élément neutre de A pour $i = n - 1$, et 1_A pour $i \geq n$;

— pour $i > j \geq 0$, l'application $*_j^i$ vaut 1_0 pour $i < n$, l'addition $A \times A \rightarrow A$ pour $i \geq n$ et $j < n$, et vaut l'identité 1_A sinon (on a

$$\mathcal{K}(A, n)_i \times_{\mathcal{K}(A, n)_j} \mathcal{K}(A, n)_i = \begin{cases} 0 \times_0 0 \simeq 0 & \text{si } i < n, \\ A \times_0 A \simeq A \times A & \text{si } i \geq n \text{ et } j < n, \\ A \times_A A \simeq A & \text{si } j \geq n. \end{cases}$$

Il est immédiat que $\mathcal{K}(A, n)$ est simplement connexe et que pour tout $k \geq 2$, on a

$$\pi_k(\mathcal{K}(A, n), e) = \begin{cases} A & \text{si } k = n, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut définir de manière analogue des ∞ -groupoïdes stricts $\mathcal{K}(E, 0)$ si E est un ensemble, et $\mathcal{K}(G, 1)$ si G est un groupe. Le ∞ -groupoïde $\mathcal{K}(E, 0)$ a pour composantes connexes les éléments de E , et pour tout objet x de $\mathcal{K}(E, 0)$ et tout $k \geq 1$, le groupe $\pi_k(\mathcal{K}(E, 0), x)$ est trivial. Quant à $\mathcal{K}(G, 1)$, il possède un unique objet e (en particulier, il est 0-connexe), et pour tout $k \geq 1$, on a

$$\pi_k(\mathcal{K}(G, 1), e) = \begin{cases} G & \text{si } k = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On appellera les ∞ -groupoïdes définis dans ce paragraphe les *∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane*.

Proposition 4.14. — *Soit C un complexe dans $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$. Alors, dans $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$, C est isomorphe (non canoniquement) à $\prod_{n \geq 2} H_n(C)[n]$.*

Démonstration. — Nous allons utiliser la structure de catégorie triangulée de $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ munie de l'auto-équivalence de catégories qui à un complexe C associe le complexe $C[1]$ défini par $C[1]_i = C_{i-1}$.

Soit C un complexe dans $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$. Notons $d_i : C_i \rightarrow C_{i-1}$ sa différentielle. Pour tout entier k , on notera

$$\begin{aligned} \tau_{\geq k}(C) &= \cdots \rightarrow C_{k+2} \rightarrow C_{k+1} \rightarrow \text{Ker } d_k \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \\ \tilde{\tau}_{\geq k}(C) &= \cdots \rightarrow C_{k+2} \rightarrow C_{k+1} \rightarrow X_k \rightarrow \text{Im } d_k \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \\ \tau_{\leq k}(C) &= \cdots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \text{Coker } d_{k+1} \rightarrow C_{k-1} \rightarrow C_{k-2} \rightarrow \cdots \end{aligned}$$

Fixons $n \geq 2$. On a une suite exacte

$$0 \rightarrow \tilde{\tau}_{\geq n+1}(C) \rightarrow C \rightarrow \tau_{\leq n}(C) \rightarrow 0$$

dans $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$. Par ailleurs, le morphisme canonique $\tau_{\geq n+1}(C) \rightarrow \tilde{\tau}_{\geq n+1}(C)$ est un quasi-isomorphisme. On dispose donc dans $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ d'un triangle distingué

$$\tau_{\geq n+1}(C) \rightarrow C \rightarrow \tau_{\leq n}(C) \rightarrow \tau_{\geq n+1}(C)[1].$$

Or tout morphisme, d'un complexe concentré en degré inférieur ou égal à n , vers un complexe concentré en degré supérieur ou égal à $n+2$, est nul dans $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ car les $\text{Ext}_{\mathbf{Ab}}^{(n+2)-n} = \text{Ext}_{\mathbf{Ab}}^2$ sont triviaux. Ainsi, le morphisme de connexion de $\tau_{\leq n}(C)$ vers $\tau_{\geq n+1}(C)[1] = \tau_{\geq n+2}(C[1])$ est nul. Par conséquent, le triangle ci-dessus est scindé

et on dispose donc d'une section $\tau_{\leq n}(C) \rightarrow C$. En composant l'inclusion canonique $H_n(C)[n] \rightarrow \tau_{\leq n}(C)$ et cette section, on obtient un morphisme

$$H_n(C)[n] \rightarrow C$$

de $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ qui induit un isomorphisme sur le H_n .

En passant à la somme directe, on obtient un morphisme

$$\bigoplus_{n \geq 2} H_n(C)[n] \rightarrow C$$

de $D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$. Ce morphisme induit des isomorphismes sur tous les H_n et est donc un isomorphisme. Par ailleurs, on a $\bigoplus_{n \geq 2} H_n(C)[n] = \prod_{n \geq 2} H_n(C)[n]$, d'où le résultat. \square

Remarques 4.15. —

1. On a utilisé implicitement dans la preuve ci-dessus le fait que le foncteur de localisation $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab}) \rightarrow D_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ commute aux produits et aux sommes.

2. On démontre de manière similaire le résultat analogue dans $D_{\geq k}(\mathbf{Ab})$ pour k quelconque.

Remarque 4.16. — Un complexe C dans $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ est isomorphe à $\prod_{n \geq 2} H_n(C)[n]$ dans $C_{\geq 2}(\mathbf{Ab})$ si et seulement si sa différentielle est nulle. Dans l'équivalence de catégories entre $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}$ et $C_{\geq 2}(\mathcal{A})$, ces complexes correspondent aux ∞ -groupoïdes stricts qui vérifient $s_n = t_n$ pour $n \geq 1$. Ainsi, un ∞ -groupoïde dans $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2}$ est isomorphe à un produit de ∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane si et seulement si ses sources et buts coïncident. Le résultat est également vrai dans $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}$.

Théorème 4.17. —

1. Soit G un ∞ -groupoïde strict 1-réduit d'unique objet e . On a dans $\text{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2})$ un isomorphisme (non canonique)

$$G \simeq \prod_{n \geq 2} \mathcal{K}(\pi_n(G, e), n).$$

2. Soit G un ∞ -groupoïde strict simplement connexe. On a dans $\text{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd})$ un isomorphisme (non canonique)

$$G \simeq \prod_{n \geq 2} \mathcal{K}(\pi_n(G, x), n),$$

où x est un objet quelconque de G .

Démonstration. — Le premier point est une conséquence immédiate de la proposition précédente et de l'équivalence des catégories entre $\text{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2})$ et $\text{Ho}(C_{\geq 2}(\mathbf{Ab}))$ (corollaire 4.11).

Le second point résulte du fait que tout ∞ -groupoïde strict simplement connexe est faiblement équivalent à un ∞ -groupoïde strict 1-réduit (proposition 4.2) et du fait que le foncteur d'inclusion $\infty\text{-}\mathcal{Gpd}_{\geq 2} \rightarrow \infty\text{-}\mathcal{Gpd}$ commute aux produits. \square

Remarque 4.18. — *A priori*, pour rendre la preuve du second point ci-dessus correcte, il faudrait considérer le produit de ∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane apparaissant

dans l'énoncé comme un produit dans $\infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd}$ (plutôt que dans $\text{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd})$). Cette distinction n'a en fait pas lieu d'être car le foncteur de localisation $\infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd} \rightarrow \text{Ho}(\infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd})$ commute aux produits. Cela résulte immédiatement du fait que tous les ∞ -groupoïdes stricts sont fibrants pour la structure de catégorie de modèles de Brown-Golasiński.

5. Types d'homotopie et ∞ -groupoïdes stricts

5.1. — On appellera *foncteur de réalisation de Simpson* (la notion est inspirée de [22]) la donnée d'un foncteur $Q : \infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd} \rightarrow \text{Top}$ muni d'une application

$$b : G_0 \rightarrow Q(G)$$

naturelle en G , induisant une bijection

$$\pi_0(G) \rightarrow \pi_0(Q(G)),$$

et d'isomorphismes

$$\pi_n(G, x) \rightarrow \pi_n(Q(G), b(x)), \quad \text{pour } n \geq 1,$$

naturels en (G, x) .

Dans la suite, on se donne un foncteur de réalisation de Simpson Q . On notera $R : \infty\text{-}\mathcal{G}\text{pd} \rightarrow \text{Hot}$ le composé PQ où P est le foncteur de localisation $\text{Top} \rightarrow \text{Hot}$.

5.2. — Soient A un groupe abélien et $n \geq 2$. Considérons le ∞ -groupoïde d'Eilenberg-Mac Lane $\mathcal{K}(A, n)$ et notons e son unique objet. Par définition, $Q(\mathcal{K}(A, n))$ est connexe et on a

$$\pi_m(Q(\mathcal{K}(A, n)), b(e)) = \begin{cases} A & \text{si } m = n, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Autrement dit, $Q(\mathcal{K}(A, n))$ est un espace d'Eilenberg-Mac Lane de type $K(A, n)$.

De même, si E est un ensemble et G un groupe, les espaces $Q(\mathcal{K}(A, 0))$ et $Q(\mathcal{K}(G, 1))$ sont des espaces d'Eilenberg-Mac Lane de types respectifs $K(E, 0)$ et $K(G, 1)$.

Proposition 5.3. — *Le foncteur Q commute aux produits de ∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane à équivalence faible près. Plus précisément, pour tout ensemble A_0 , tout groupe A_1 et tous groupes abéliens A_n pour $n \geq 2$, le morphisme canonique*

$$Q\left(\prod_{n \geq 0} \mathcal{K}(A_n, n)\right) \rightarrow \prod_{n \geq 0} Q(\mathcal{K}(A_n, n))$$

est une équivalence faible topologique.

Démonstration. — Fixons un entier positif n . On notera

$$p_n : \prod_{n \geq 0} \mathcal{K}(A_n, n) \rightarrow \mathcal{K}(A_n, n) \quad \text{et} \quad q_n : \prod_{n \geq 0} Q(\mathcal{K}(A_n, n)) \rightarrow Q(\mathcal{K}(A_n, n))$$

les projections canoniques. On dispose du triangle commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} Q\left(\prod_{n \geq 0} \mathcal{K}(A_n, n)\right) & \xrightarrow{f} & \prod_{n \geq 0} Q(\mathcal{K}(A_n, n)) \\ & \searrow^{Q(p_n)} & \swarrow_{q_n} \\ & Q(\mathcal{K}(A_n, n)) & \end{array}$$

Pour $n = 0$, le morphisme p_0 induit une bijection sur le π_0 . Il en est donc de même de $Q(p_0)$. Par ailleurs, q_0 induit également une bijection sur le π_0 . Il en est donc de même de f .

Soit $n \geq 1$. Le morphisme p_n induit un isomorphisme sur le π_n pour tout point de base. Le morphisme $Q(p_n)$ induit donc un isomorphisme sur le π_n pour tout point de base de la forme $b(x)$, où x est un objet de $\prod_{n \geq 0} \mathcal{K}(A_n, n)$. Puisque b induit une bijection sur le π_0 , l'application $Q(p_n)$ induit un isomorphisme sur le π_n pour tout point de base. Par ailleurs, l'application q_n induit également un isomorphisme sur le π_n pour tout point de base. On en déduit que c'est également le cas de f , d'où le résultat. \square

Remarque 5.4. — Le foncteur de localisation $\mathcal{Top} \rightarrow \mathbf{Hot}$ commute aux produits. Cela résulte, par exemple, du fait que tout espace topologique est fibrant pour la structure de catégorie de modèles usuelle sur \mathcal{Top} . La proposition précédente peut donc se reformuler en disant que le foncteur $R : \infty\text{-Gpd} \rightarrow \mathbf{Hot}$ commute aux produits de ∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane.

Theorème 5.5. — *Les types d'homotopie simplement connexes dans l'image essentielle du foncteur R sont exactement les produits d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane.*

Démonstration. — Un type d'homotopie simplement connexe provient d'un ∞ -groupoïde strict simplement connexe. Par le théorème 4.17, un tel ∞ -groupoïde est relié par un zigzag d'équivalences faibles à un produit de ∞ -groupoïdes d'Eilenberg-Mac Lane. On en déduit immédiatement le résultat par la proposition précédente. \square

Proposition 5.6. — *Soit X un CW-complexe connexe de dimension finie $n \geq 1$. Si X a un groupe d'homotopie $\pi_m(X)$ non trivial pour $m > n$, alors le type d'homotopie de X n'est pas un produit d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane. En particulier, les sphères de dimension n pour $n \geq 2$ n'ont pas le type d'homotopie d'un produit d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane.*

Démonstration. — Si X avait le type d'homotopie d'un tel produit, on aurait

$$H_m(X) \simeq H_m(X'),$$

où

$$X' = \prod_{1 \leq k \leq m+1} K(\pi_k(X), k).$$

Écrivons

$$X' = K(\pi_m(X), m) \times Y, \quad \text{où } Y = \prod_{\substack{1 \leq k \leq m+1 \\ k \neq m}} K(\pi_k(X), k).$$

En appliquant la formule de Künneth à cette décomposition de X' , on obtient une injection de $H_m(K(\pi_m(X), m)) \otimes H_0(Y) \cong \pi_m(X)$ dans $H_m(X') \simeq H_m(X)$. Mais puisque $m > n$, $H_m(X)$ est trivial et il en est donc de même de $\pi_m(X)$. Contradiction.

Ce résultat s'applique aux sphères de dimension $n \geq 2$ car

$$\pi_3(S^2) = \mathbf{Z} \quad \text{et} \quad \pi_{n+1}(S^n) = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}, \quad \text{pour } n \geq 3. \quad \square$$

Corollaire 5.7. — *Le foncteur R n'est pas essentiellement surjectif.*

Proposition 5.8. — *L'image essentielle du foncteur R est contenue dans la classe des espaces dont chaque composante connexe a pour revêtement universel un produit d'espaces d'Eilenberg-Mac Lane.*

Démonstration. — Soit G un ∞ -groupeïde strict. Quitte à décomposer G en une somme sur ses composantes connexes, on peut supposer que G est 0-connexe. Choisissons un objet de G et appelons G' le sous- ∞ -groupeïde 1-réduit de G déterminé par cet objet. Notons $X = Q(G)$ et $X' = Q(G')$. L'inclusion $i : G' \rightarrow G$ induit des isomorphismes sur les π_n pour $n \geq 2$ et il en est donc de même de $Q(i) : X \rightarrow X'$. On notera X_{cw} (resp. X'_{cw}) un remplacement cellulaire de X (resp. de X'), c'est-à-dire un CW-complexe muni d'une fibration triviale $r : X_{\text{cw}} \rightarrow X$ (resp. $r' : X'_{\text{cw}} \rightarrow X'$). Soit $\pi : \tilde{X} \rightarrow X_{\text{cw}}$ le revêtement universel de X_{cw} . La simple connexité de X' et donc de X'_{cw} entraîne l'existence d'une application continue $X'_{\text{cw}} \rightarrow \tilde{X}$ rendant le triangle

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \tilde{X} \\ & & & & \downarrow \pi \\ & & & & X_{\text{cw}} \\ & & & & \downarrow r \\ X'_{\text{cw}} & \xrightarrow{r'} & X' & \xrightarrow{Q(i)} & X \end{array}$$

commutatif. Puisque X'_{cw} et \tilde{X} sont simplement connexes, et que $Q(i)r'$ et $r\pi$ induisent des isomorphismes sur les π_n pour $n \geq 2$, l'application $X'_{\text{cw}} \rightarrow \tilde{X}$ est une équivalence faible. D'où le résultat par le théorème 5.5. \square

6. Types d'homotopie et 3-groupeïdes quasi-stricts

Pour tenter de contourner le caractère non essentiellement surjectif d'un tel foncteur de réalisation de Simpson, Kapranov et Voedvosky ont affaibli la notion de n -groupeïde en demandant seulement l'existence d'inverses « faibles » (voir [16]). Simpson a démontré dans [22] que cela ne suffit pas. Dans ce paragraphe, nous exposons un autre argument. Nous utiliserons la notion de n -groupeïde présentée par Street dans [24]. Celle-ci est équivalente par le corollaire 4.4 de [15] à celle de Kapranov et Voedvosky. Nous nous plaçons ici dans le cas $n = \infty$ qui est développé dans [18].

Soient C une ∞ -catégorie stricte et x, y deux n -flèches de C pour $n \geq 0$. On définit par coïnduction mutuelle les deux notions suivantes :

- les n -flèches x et y sont *faiblement homotopes* s'il existe une $(n+1)$ -flèche *faiblement inversible* $u : x \rightarrow y$;

— une $(n + 1)$ -flèche $u : x \rightarrow y$ est *faiblement inversible* s'il existe une $(n + 1)$ -flèche $v : y \rightarrow x$ telle que les $(n + 1)$ -flèches $v *_n^{n+1} u : x \rightarrow x$ et $u *_n^{n+1} v : y \rightarrow y$ soient *faiblement homotopes* à des identités.

On dira qu'une ∞ -catégorie stricte est un ∞ -groupoïde *quasi-strict* si toutes ses n -flèches pour $n \geq 1$ sont faiblement inversibles.

Soient G une ∞ -catégorie stricte et n un entier positif. On montre (proposition 6 de [18]) que la relation de faible homotopie sur C_n est une relation d'équivalence. Si de plus G est un ∞ -groupoïde quasi-strict, alors par définition, deux n -flèches u, v de G_n sont faiblement homotopes si et seulement si elles sont homotopes. On en déduit que la relation d'homotopie est une relation d'équivalence sur G_n . On peut donc définir l'ensemble $\pi_0(G)$ et les groupes $\pi_n(G, x)$ pour x un objet de G , et donc la notion d'*équivalence faible de ∞ -groupoïdes quasi-stricts*, de la même manière que dans le cas strict.

Soit G un 3-groupoïde quasi-strict 1-réduit. Par définition, G est une 3-catégorie stricte 1-réduite telle que les 2-flèches aient un $*_1^2$ -inverse à une 3-flèche près, et que les 3-flèches aient un $*_2^3$ -inverse. En désuspendant G deux fois (c'est-à-dire en considérant les 2-flèches de G comme des objets et ses 3-flèches comme des 1-flèches), on obtient une catégorie monoïdale symétrique C , avec une symétrie et des contraintes triviales, qui est un groupoïde, et telle que le monoïde $\pi_0(C)$ est un groupe (abélien). La catégorie C est un champ de Picard (sur le point) au sens de l'exposé XVIII de [13]. Ainsi, en vertu du lemme 1.4.13 de *op. cit.*, il existe une catégorie monoïdale symétrique D , avec une symétrie et des contraintes triviales, qui est un groupoïde et telle que le monoïde D_0 est un groupe (abélien), ainsi qu'un foncteur monoïdale symétrique (fort) de D vers C qui est une équivalence faible. En désuspendant deux fois, on obtient un 3-groupoïde strict H et un *pseudo-foncteur* $H \rightarrow G$ (c'est-à-dire un 3-foncteur qui ne respecte les compositions et identités qu'à isomorphisme près, ou plus précisément, un trihomomorphisme au sens de [11]) qui est une équivalence faible.

Ainsi, tout 3-groupoïde quasi-strict simplement connexe est faiblement équivalent à un 3-groupoïde strict *via* un *pseudo-foncteur*. Les 3-groupoïdes quasi-stricts simplement connexes ne modélisent donc pas plus de types d'homotopie que les 3-groupoïdes stricts simplement connexes. En particulier, ils ne modélisent pas le 3-type associé à la sphère de dimension 2 (comme le montre la démonstration de la proposition 5.6).

Il a par contre été démontré indépendamment par Leroy ([19]) et Joyal et Tierney (dans un texte non publié datant de 1984, depuis égaré) que les 3-groupoïdes faibles (au sens de [11]) modélisent bien les 3-types d'homotopie (voir également [5] et [17]).

7. Deux questions

Ce texte ne répond pas à la question suggérée par son titre :

Question 7.1. — *Quels sont les types d'homotopie modélisés par les ∞ -groupoïdes stricts ?*

Dans une version précédente de ce texte, nous avons formulé cette question de manière plus précise en fixant un foncteur de réalisation de Simpson. La question devenait alors : quelle est l'image essentielle du foncteur $\infty\text{-Gpd} \rightarrow \mathbf{Hot}$ induit ? Il n'est cependant

pas clair que la réponse à cette question ne dépende pas du choix du foncteur de réalisation de Simpson. Le foncteur $\infty\text{-Gpd} \rightarrow \mathbf{Hot}$ qui nous intéresse vraiment ici est celui induit par l'inclusion des ∞ -groupoïdes stricts dans les ∞ -groupoïdes faibles, la catégorie homotopique de ceux-ci étant, d'après la conjecture de Grothendieck, la catégorie homotopique \mathbf{Hot} (si on interprète « ∞ -groupoïdes faibles » comme « ∞ -groupoïdes de Grothendieck », ce foncteur d'inclusion est construit dans [3]). La proposition 5.8 donne une condition nécessaire pour être dans l'image essentielle de ce foncteur.

Une deuxième question naturelle est la généralisation de la question précédente aux ∞ -groupoïdes quasi-stricts. En particulier, les ∞ -groupoïdes quasi-stricts modélisent-ils plus de types d'homotopie que les ∞ -groupoïdes stricts ? Plus précisément, en notant $\infty\text{-Gpd}_{\text{qs}}$ la sous-catégorie pleine de $\infty\text{-Cat}$ formée des ∞ -groupoïdes quasi-stricts, nous proposons la question suivante :

Question 7.2. — *Le foncteur $\text{Ho}(\infty\text{-Gpd}) \rightarrow \text{Ho}(\infty\text{-Gpd}_{\text{qs}})$, induit par le foncteur d'inclusion $\infty\text{-Gpd} \rightarrow \infty\text{-Gpd}_{\text{qs}}$, est-il une équivalence de catégories ?*

Références

- [1] D. ARA — « Sur les ∞ -groupoïdes de Grothendieck et une variante ∞ -catégorique », Thèse, Université Paris 7, 2010.
- [2] ———, « On the homotopy theory of Grothendieck ∞ -groupoids », *J. Pure Appl. Algebra* **217** (2013), no. 7, p. 1237–1278.
- [3] ———, « Strict ∞ -groupoids are Grothendieck ∞ -groupoids », *J. Pure Appl. Algebra* **217** (2013), no. 12, p. 2298–2312.
- [4] D. ARA & F. MÉTAYER — « The Brown-Golasiński model structure on strict ∞ -groupoids revisited », *Homology Homotopy Appl.* **13** (2011), no. 1, p. 121–142.
- [5] C. BERGER — « Double loop spaces, braided monoidal categories and algebraic 3-type of space », in *Higher homotopy structures in topology and mathematical physics*, Contemp. Math., vol. 227, Amer. Math. Soc., 1999, p. 49–66.
- [6] D. BOURN — « Another denormalization theorem for abelian chain complexes », *J. Pure Appl. Algebra* **66** (1990), no. 3, p. 229–249.
- [7] R. BROWN & M. GOLASIŃSKI — « A model structure for the homotopy theory of crossed complexes », *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* **30** (1989), no. 1, p. 61–82.
- [8] R. BROWN & P. J. HIGGINS — « The equivalence of ∞ -groupoids and crossed complexes », *Cahiers Topologie Géom. Différentielle* **22** (1981), no. 4, p. 371–386.
- [9] ———, « The classifying space of a crossed complex », *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* **110** (1991), no. 1, p. 95–120.
- [10] P. GABRIEL & M. ZISMAN — *Calculus of fractions and homotopy theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 35, Springer-Verlag, 1967.
- [11] R. GORDON, A. J. POWER & R. STREET — *Coherence for tricategories*, vol. 117, Mem. Amer. Math. Soc., no. 558, Amer. Math. Soc., 1995.
- [12] A. GROTHENDIECK — « Pursuing stacks », Manuscrit, 1983, à paraître dans la collection Documents Mathématiques.

- [13] A. GROTHENDIECK, M. ARTIN & J.-L. VERDIER – *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas* (SGA4), Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer-Verlag, 1972–1973.
- [14] L. ILLUSIE – *Complexe cotangent et déformations. II*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 283, Springer-Verlag, 1972.
- [15] S. KANSANGIAN, G. METERE & E. VITALE – « Weak inverses for strict n -categories », Prépublication, 2009.
- [16] M. M. KAPRANOV & V. A. VOEVODSKY – « ∞ -groupoids and homotopy types », *Cahiers Topologie Géom. Différentielle Catég.* **32** (1991), no. 1, p. 29–46.
- [17] S. LACK – « A Quillen model structure for Gray-categories », *J. K-Theory* **8** (2011), no. 2, p. 183–221.
- [18] Y. LAFONT, F. MÉTAYER & K. WORYTKIEWICZ – « A folk model structure on omega-cat », *Adv. Math.* **224** (2010), no. 3, p. 1183–1231.
- [19] O. LEROY – « Sur une notion de 3-catégorie adaptée à l'homotopie », prépublication de l'université Montpellier II, 1994.
- [20] G. MALTSINIOTIS – *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*, Astérisque, no. 301, Soc. Math. France, 2005.
- [21] J. MILNOR – « The geometric realization of a semi-simplicial complex », *Ann. of Math. (2)* **65** (1957), p. 357–362.
- [22] C. SIMPSON – « Homotopy types of strict 3-groupoids », arXiv :math/9810059v1 [math.CT], 1998.
- [23] ———, *Homotopy theory of higher categories*, New mathematical monographs, vol. 19, Cambridge University Press, 2011.
- [24] R. STREET – « The algebra of oriented simplexes », *J. Pure Appl. Algebra* **49** (1987), no. 3, p. 283–335.

DIMITRI ARA, Institut de Mathématiques de Jussieu, Université Paris Diderot – Paris 7, Case 7012,
Bâtiment Chevaleret, 75205 Paris Cedex 13, France • *E-mail* : ara@math.jussieu.fr
Url : <http://people.math.jussieu.fr/~ara/>